

# Urvalsprov A 2026

## Lösningar

### Den fördjupade differentierade delen i matematik

#### C1 Uppgift i matematik.

**C1.1** Svaret är ca 1362 euro.

Motivering: Det nödvändiga kapitalet fås genom att diskontera stipendierna som betalas ut efter 1, 2 och 3 år med räntekoefficienten  $q = 1,05$ . Det investerade kapitalet behöver alltså vara

$$K = 500q^{-1} + 500q^{-2} + 500q^{-3} = 1361,624\dots$$

**C1.2** Svaret är  $90^\circ$ .

Motivering: Vektorn från punkten  $B$  till punkten  $A$  är  $\overline{BA} = \vec{i} + 2\vec{j} - (4\vec{i} + \vec{j}) = -3\vec{i} + \vec{j}$ . På motsvarande sätt är vektorn från  $B$  till  $C$  lika med  $\overline{BC} = 5\vec{i} + 4\vec{j} - (4\vec{i} + \vec{j}) = \vec{i} + 3\vec{j}$ . Dessa vektorers skalärprodukt är  $\overline{BA} \cdot \overline{BC} = (-3\vec{i} + \vec{j}) \cdot (\vec{i} + 3\vec{j}) = -3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 0$ , så triangelns sidor  $BA$  och  $BC$  ligger vinkelrätt mot varandra. Den sökta vinkeln är alltså  $90^\circ$ .

**C1.3** Ett möjligt svar:  $a = 2$ ,  $b = \frac{12\pi}{149}$ ,  $c = -\frac{245\pi}{298}$  och  $d = 6$ , vilket ger

$$h(t) = 2 \sin\left(\frac{12\pi}{149}t - \frac{245\pi}{298}\right) + 6.$$

Motivering: Konstanterna är inte entydigt bestämda, utan de beror på hur man väljer tecknet på  $a$  och vilken av sinusfunktionens minimipunkt man väljer. I den här modellösningen använder vi att sinusfunktionens minsta värde  $-1$  tas i punkten  $-\frac{\pi}{2}$ , vilket leder till att sinusfunktionen tar sitt följande maximala värde  $1$  i punkten  $\frac{\pi}{2}$ .

Vi väljer också  $a > 0$ , och får att vattnets högsta nivå är  $8 = a \cdot 1 + d$ , medan dess lägsta nivå är  $4 = a \cdot (-1) + d$ . Då fås ekvationssystemet

$$\begin{cases} a + d = 8 \\ -a + d = 4. \end{cases}$$

Genom att subtrahera den andra ekvationen från den första fås att  $2a = 4$ , dvs.  $a = 2$ . Genom att sätta in detta värde på  $a$  i den första ekvationen fås  $d = 6$ .

Tidpunkterna som svarar mot de lägsta respektive högsta vattennivåerna är 4.00 och 16.25, där den senare betyder  $16 + \frac{25}{60} = \frac{197}{12}$  timmar. De här bildar ekvationssystemet

$$\begin{cases} b \cdot 4 + c = -\frac{\pi}{2} \\ b \cdot \frac{197}{12} + c = \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Genom att subtrahera den första ekvationen från den andra får vi  $b \cdot \frac{149}{12} = \pi$ , vilket ger  $b = \frac{12\pi}{149}$ . Genom att sätta in det här i den första ekvationen fås sedan slutligen  $c = -\frac{245\pi}{298}$ .

## C2 Uppgift i matematik.

### C2.1 Modellösning: Eftersom

$$b(t) = b(0) e^{kt},$$

så fås att

$$b'(t) = b(0) e^{kt} \cdot k = k \cdot b(t),$$

vilket visar att förändringshastigheten  $b'(t)$  är direkt proportionell mot antalet  $b(t)$  för alla värden på  $t$ , med proportionalitetskonstant  $k$ .

### C2.2 Modellösning:

$$b(t + T) = 2b(t) \Leftrightarrow b(0) e^{k(t+T)} = 2b(0) e^{kt} \Leftrightarrow b(0) e^{kt} e^{kT} = 2b(0) e^{kt} \Leftrightarrow b(0) e^{kT} = 2b(0).$$

Om  $b(0) = 0$ , så gäller för alla  $t$  att  $b(t) = 0$ , och då kan man välja vilket tal som helst till fördubblingstid, t.ex.  $T = k$ .

Ifall att  $b(0) \neq 0$ , så fås genom division att

$$e^{kT} = 2 \Leftrightarrow kT = \ln 2 \Leftrightarrow T = \frac{\ln 2}{k}.$$

Fördubblingstiden  $T$  beror alltså inte av tidpunkten  $t$ .

### C2.3 Modellösning: Genom en direkt uträkning fås

$$\frac{1}{T} \int_0^T b(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T b(0) e^{kt} dt = \frac{b(0)}{T} \int_0^T \frac{1}{k} e^{kt} = \frac{b(0)}{kT} (e^{kT} - e^0) = \frac{b(0)}{\ln 2} (e^{\ln 2} - 1) = \frac{b(0)}{\ln 2}.$$

Det efterfrågade medelvärdet beror alltså inte på  $k$ .